和劑局方

九卷至十卷

宇

v.5

LIBRARY
MAR 16 1972
UNIVERSITY OF TORONTO

增廣太平惠民和劑局方卷九

治婦人諸疾 外有治療諸方互見各類

熟乾地黃圓 治婦人風虛勞冷一切諸疾或風寒邪氣留滯經絡氣血冷澀不能溫潤肌膚或風寒客於腹內則脾胃冷弱不能剋消水穀或腸虛受冷大便時泄或子藏挾寒久不成胎月水不調乍多乍少或月前月後或淋瀝不止或閉斷不通結聚癥瘕面體少色飲食進退肌肉消瘦百節酸疼時發寒熱漸至羸損帶漏五色陰中冷痛時發𤻲痒月水將行臍腹先痛皮膚皺澀癮

疹瘙痒麻痺筋攣面生䵟黯髮黃脫落目淚自出心忪目眩及產後勞損未復肌瘦寒熱顏色枯黑飲食無味漸成蓐勞並皆療之

熟乾地黃酒浸　五味子揀淨　柏子仁微炒別研　芎藭各一兩半

澤蘭去梗二兩一分　禹餘糧火燒紅醋淬七徧細研　防風去蘆叉

肉蓯蓉酒浸一宿　白茯苓去皮　厚朴去粗皮薑汁炙　白芷

乾薑炮　山藥　細辛去苗　卷柏去根各一兩

當歸去蘆酒浸炒　藁本去蘆洗　甘草炙各一兩三分　蛇床子揀淨微炒

牛膝去苗酒浸一宿　人參　續斷　蕪荑炒

蜀椒去目及閉口者微炒出汗　杜仲去粗皮炙黃　艾葉炒各三分

赤石脂煅醋淬　石膏煅研飛各二兩　肉桂去粗皮　石斛去根

白朮各一兩一分　紫石英煅醋淬研飛各三兩

右件藥搗羅為末煉蜜和搗五七百杵圓如梧桐子大每服三十圓溫酒或米飲下空心食前服常服養血補氣和順榮衛充實肌膚調勻月水長髮駐顏除風去冷令人有子溫平不熱無毒妊娠不宜服之

澤蘭圓治產後勞傷腑臟虛羸未復氣血不調肢體瘦弱困乏少力面色萎黃心常驚悸多汗嗜臥飲食不進產後百日內每日常服壯氣益血暖下臟進飲食

黃芪　澤蘭去梗　牛膝去苗酒浸一宿　人參去蘆
赤石脂煅各一兩　附子炮去皮臍　木香　萆薢
白茯苓去皮　續斷各三分　肉桂去粗皮　芎藭
白朮　乾薑炮　當歸去蘆剉微炒　甘草炙微赤各半兩
熟乾地黃淨洗洒酒蒸焙一兩半

右為末煉蜜圓如梧桐子大每三十圓溫米飲下空心食前

人參荊芥散治婦人血風勞氣身體疼痛頭昏目澀心忪煩倦寒熱盜汗頰赤口乾痰嗽胸滿精神不爽或月水不調臍腹㽲痛痃癖塊硬疼痛發歇或時嘔逆飲食

不進或因產將理失節淹延瘦瘁乍起乍臥甚即著床

荆芥穗　羚羊角鎊　酸棗仁微炒　生乾地黃

枳殼麩炒去瓤秤　人參　鱉甲醋浸去裙炙黃　肉桂去粗皮

白朮　柴胡各七兩半　甘草剉爁　芎藭

赤芍藥　牡丹皮　當歸　防風去苗叉各五兩

右為麄末每服三錢水一盞半生薑三片煎至八分去滓熱服不拘時日二服常服除一切風虛勞冷宿病有孕不宜服

牡丹皮圓 治婦人衝任本虛少腹挾寒或因產勞損子臟風寒搏於血氣結生瘕聚塊硬發歇臍腹刺痛脇肋

緊脹腰膝疼重拘攣腫滿背項强急手足麻痺或月水不調或瘀滯澀閉或崩漏帶下少腹冷疼寒熱盜汗四肢酸痛面色痿黃多生䵟黷羸乏少力心多驚悸不欲飲食

延胡索　縮砂仁各半兩　赤芍藥　牡丹皮各一兩

山茱萸　乾薑炮各半兩　龍骨細研水飛　檳榔

熟乾地黃酒浸　羌活各二兩　藁本去土　五味子

人參　白芷　當歸去蘆酒浸　乾山藥

澤瀉　續斷細者　肉桂去粗皮　白茯苓

白朮　附子去皮臍　牛膝去苗酒浸一宿焙

木香　萆薢炮為末炒熟各一兩　石斛去根酒浸三兩

右為細末煉蜜和圓如梧桐子大每服二十圓至三十圓溫酒或醋湯下空心食前日二服姙娠不宜服

熟乾地黃散治婦人勞傷血氣臟腑虛損風冷邪氣乘虛客搏肢體煩痛頭目昏重心多驚悸寒熱盜汗羸瘦少力飲食不進

丹參去蘆頭　防風去蘆叉　當歸去蘆微　細辛去苗

藁本去蘆洗　芎藭各半兩　人參　白朮

白茯苓去皮　肉桂去粗皮　熟地黄酒洒蒸焙各一兩

續斷　附子炮去皮臍　黄芪去蘆各三分

右為細散每服四錢水一盞半入生薑半分棗三枚擘破煎至一盞濾去滓食前溫服

安息活血丹治衝任不足下焦久寒臍腹疞痛月事不勻或來多不斷或過期不來或崩中去血或帶下不止面色痿黃肌肉瘦瘁肢體沉重胸脇脹滿氣力衰乏飲食減少一切血氣虛寒並宜服之

吴茱萸湯浸七徧焙乾微炒　安息香搗碎入好酒研澄濾去滓銀器內慢火熬成膏

柏子仁　山茱萸去核　延胡索

桃仁去皮尖麸炒微黄　虎杖　當歸
杜仲去粗皮剉炒　附子炮去皮臍　木香各二十兩　澤蘭葉
乾薑炮　肉桂去粗皮　艾葉微炒　黃芪去蘆
牡丹皮各二斤半　肉蓯蓉酒浸焙　厚朴去粗皮薑汁炙令熟各五斤
右為細末以前安息香膏入白麪同煮作糊和圓如梧桐子大每服三十圓食前以溫酒下醋湯亦得

吳茱萸湯治婦人藏氣本虛宿挾風冷胸膈滿痛腹脇疞刺嘔吐惡心飲食減少身面虛浮惡寒戰慄或泄痢不止少氣羸困及因而生產臟氣暴虛邪冷內勝宿疾

轉甚並皆治之

桔梗去苗半兩　吳茱萸湯洗七遍微炒二兩　熟乾地黃三分

防風去苗又　乾薑炮　甘草炙　當歸去苗微炒

細辛去苗各半兩

右為粗散每服三錢水一盞煎至八分細濾去滓熱服空心食前

溫經湯治衝任虛損月候不調或來多不斷或過期不來或崩中去血過多不止又治曾經損娠瘀血停留少腹急痛發熱下利手掌煩熱唇乾口燥及少腹有寒久不受胎

阿膠蛤粉碎炒　當歸去蘆　芎藭　人參

肉桂去粗皮　甘草炒　芍藥　牡丹皮各二兩

半夏湯洗七次二兩半　吳茱萸湯洗七次焙炒三兩

麥門冬去心五兩半

右為粗末每服三錢水一盞半入生薑五片煎至八分去滓熱服空心食前服

禹餘糧圓治婦人帶下久虛胞絡傷敗月水不調漸成崩漏氣血虛竭面黃體瘦臍腹裏急腰膝疼重肢體煩痛心忪頭眩手足寒熱不思飲食

桑寄生　柏葉微炒　厚朴去粗皮塗薑汁炙

當歸去蘆微炒　附子炮去皮臍　鱉甲醋浸去裙炙黃　乾薑炮

白朮各一兩　禹餘糧燒醋淬七徧飛研　白石脂各二兩

狗脊去毛　白芍藥各三分　吳茱萸湯洗七次微炒半兩

右為細末煉蜜和圓如梧桐子大每服三十圓溫酒或米飲下空心食前服

逍遙散治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心忪頰赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜臥及血熱相搏月水不調臍腹脹痛寒熱如瘧又療室女血弱陰虛榮衛不和痰嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸

甘草微炙赤半兩　當歸去苗剉微炒　茯苓去皮白者　白芍藥

白朮　柴胡去苗各一兩

右爲粗末每服二錢水一大盞燒生薑一塊切破薄荷少許同煎至七分去滓熱服不拘時候

白薇圓 調補衝任溫暖子宮治胞絡傷損宿受風寒久無子息或受胎不牢多致損墮久服去下臟風冷令人有子

秦椒去目及閉口者微炒出汗　白薇去苗　熟乾地黃

當歸去蘆剉微炒　薑黃各一兩七錢半　藁本去苗及土　牡蒙各一兩二錢半

禹餘糧火煅醋淬七徧研二兩　人參　柏子仁微炒

桑寄生　附子炮去皮臍　肉桂去粗皮　五味子去梗

吳茱萸湯浸微炒　石斛去梗　牛膝去苗酒浸一宿焙乾

甘草赤炙微　防風去苗　芎藭各一兩半

右為細末入研藥勻煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓至五十圓溫酒或米飲下空心食前服纔覺妊娠即住服已懷孕者尤不宜服之

膠艾湯治勞傷血氣衝任虛損月水過多淋瀝漏下連日不斷臍腹疼痛及妊娠將攝失宜胎動不安腹痛下墜或勞傷胞絡胞阻漏血腰痛悶亂或因損動胎上搶心奔衝短氣及因產乳衝任氣虛不能約制經血淋瀝不斷延引日月漸成羸瘦

阿膠碎炒燥　芎藭　甘草炙各二兩　當歸

艾葉微炒各三兩　白芍藥　熟乾地黃各四兩

右爲粗末每服三錢水一盞酒六分煎至八分濾去滓稍熱服空心食前日三服甚者日夜服

保生圓　養胎益血安和子臟治妊娠將理失宜或因勞役胎動不安腰腹痛重胞阻漏胎惡露時下子臟挾疾久不成胎或受妊不能固養痿燥不長過年不產日月雖滿轉動無力或致損墮及臨產節適乖宜驚動太早產時未至惡露先下胎胞枯燥致令產難或橫或逆痛極悶亂連日不產子死腹中腹上冰冷口唇青黑吐出

冷沫新產惡血上攻暈悶不省喘促汗出及瘀血未盡臍腹疞痛寒熱往來或因產勞損虛羸未復面黃體瘦心忪盜汗飲食不進漸成蓐勞入月常服壯氣養胎正順產理潤胎易產產後常服滋養血氣和調陰陽密腠理實臟腑治風虛除痼冷

大麻仁去殼一兩半　貝母　黃芩

大豆黃卷　粳米　甘草微炙赤　乾薑炮

肉桂去粗皮　石斛去根　石膏細研各一兩　當歸去蘆炒半兩

秦椒微炒出汗一兩

右爲細末煉蜜和圓如彈子大每服一圓並用溫酒或棗湯化下嚼亦得空心食前服

半夏茯苓湯治姙娠惡阻心中憒悶頭目眩暈四肢怠惰百節煩疼胸膈痰逆嘔吐惡心嫌聞食氣好噉鹹酸多卧少起全不進食

旋覆花　陳皮去穰麩炒　桔梗　白芍藥

人參　甘草微炙赤　芎藭各半兩　赤茯苓

熟乾地黃酒浸各三分　半夏湯洗十遍切焙一兩一分

右爲粗末每服二錢水一盞半生薑四片同煎至八分去滓稍熱服食前服次服茯苓圓三十餘痰下消除便能食

茯苓圓治姙娠阻病心中煩憒頭目眩重憎聞食氣嘔逆吐悶顛倒不安四肢困弱不自勝持常服此藥消痰水令能食強力養胎當先服半夏茯苓湯次進此藥

葛根　枳實去穰麩炒黃　白朮　甘草炙各二兩

赤茯苓去皮　人參　乾薑炮　肉桂去粗皮

陳皮　半夏湯洗七徧去骨切焙各一兩

右為細末煉蜜和為圓如梧桐子大每服三十圓溫米飲空心下食前服

催生丹治產婦生理不順產育艱難或橫或逆並宜服之神效

麝香一匙別研　乳香別研極細一分　母丁香取末一錢　兔腦髓臘月者去皮膜研

右拌勻以兔腦和圓如雞頭藥大陰乾用油紙密封貼每服一圓溫水下即時產下隨男左女右手中握藥圓出是驗

紹興續添方

黑神散治婦人產後惡露不盡胞衣不下攻衝心胸痞滿或臍腹堅脹撮疼及血暈神昏眼黑口噤產後瘀血諸疾並皆治之

黑豆炒半升去皮　熟乾地黃酒浸　當歸去蘆酒製　肉桂去粗皮

乾薑炮　甘草炙　芍藥　蒲黃各四兩

右為細末每服二錢酒半盞童子小便半盞同煎調下急患不拘時候連進二服

油煎散治婦人血風勞形容憔悴肢節困倦喘滿虛煩噏噏少氣發熱汗多口乾舌澀不思飲食

五加皮　牡丹皮　赤芍藥　當歸去蘆各一兩

右為末每服一錢水一盞將青銅錢一文蘸油入藥煎七分溫服煎不得攪吃不得吹日三服常服能肥婦人其効妙甚

安胎飲治妊娠三月四月至九箇月惡阻病者心中憒悶頭重目眩四肢沉重懈怠不欲執作惡聞食氣欲啖

鹹酸多睡少起嘔逆不食或胎動不安非時轉動腰腹疼痛或時下血及姙娠一切疾病並皆治之

熟乾地黃洗酒酒蒸焙　地榆　甘草微炙赤

茯苓去皮　白芍藥　當歸去蘆洗酒浸　川芎

白朮　半夏湯洗七次　阿膠搗碎麩炒　黃芪去苗各等分

右為粗散每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時如或惡食但以所思之物任意與之必愈按姙娠禁忌勿食雞鴨子鯉魚膾兔犬驢騾山羊肉魚子鱉卵雛雀桑椹叉按胎教論云令母常居靜室多聽美言聽人講論詩書陳說禮樂耳不聽非言目不視惡事心不起邪念能令生子麗厚福壽忠孝仁義聰明無疾斯乃聖人所留教論故隨方狀以書

淳祐新添方

琥珀黑龍丹 治產後一切血疾淋露不快兒枕不散積瘕堅聚按之攫手疼痛攻心困頓垂死者但灌藥無有不效

五靈脂去沙 當歸去蘆 川芎 乾地黃生者 良薑

已上各等分入沙合內赤石脂泯縫紙筋和鹽泥固濟封合炭火十觔煅通紅去火候沙合冷開取合子看成黑糟乃取出細研入後藥○一本云用粿頭沙合

花乳石煅 琥珀研各一錢 乳香別研 硫黃研各一錢半

百草霜五兩 別研

右同爲細末米醋煮糊圓如彈子大每服一圓炭火燒通紅投生薑自然汁與無灰酒各一合小便半盞研開頓服立效

吳直閣增諸家名方

南嶽魏夫人濟陰丹 治婦人血氣久冷無子及數經墮胎皆因衝任之脈虛損胞內宿挾疾病經水不時暴下不止月內再行或前或後或崩中漏下三十六疾積聚癖瘕臍下冷痛小便白濁以上疾證皆令孕育不成以至絕嗣治產後百病百日內常服除宿血生新血令人

有孕及生子充實亦治男子亡血諸疾

秦艽　石斛去根酒浸焙　藁本去蘆　甘草炙

蠶布燒灰　桔梗炒各二兩　京墨煅醋淬研　茯苓去皮各一兩

人參去蘆二兩　木香炮一兩　桃仁去皮尖炒一兩　香附炒去毛

熟乾地黃洗過酒蒸焙　澤蘭去梗各四兩　當歸去蘆

肉桂去粗皮　乾薑炮　細辛去苗　川芎

牡丹皮各一兩半　山藥　川椒去目炒各三分　蒼朮泔浸去皮八兩

糯米炒一升○一本云山藥川椒各三兩

右為細末煉蜜溲每兩作六圓每服一圓細嚼空心食前溫酒醋湯任下

續添諸局經驗秘方

琥珀圓 治婦人或老或少產前產後百病及療三十六種血冷七疝八瘕心腹刺痛卒中癱瘓半身不遂八風十二痺等手足酸疼乳中毒結瘀血懷胎驚動傷犯不安死胎不出胞衣不下並宜服之

琥珀研　辰砂別研　沈香　阿膠碎炒

肉桂去麄皮　石斛去根　附子炮去皮臍　五味子揀淨

川芎各半兩　牛膝去苗酒浸一宿　當歸去苗炒　人參

肉蓯蓉切酒浸一宿焙　續斷　沒藥研各三分

熟乾地黃　木香各一兩

右爲細末煉蜜爲圓如彈子大每服一圓空心暖酒調下午晚食前再服能生精血去惡血若人腹脇疼痛繞臍如刀刺及嘔逆上氣築心痰毒不思飲食用薑汁少許和酒服諸痢及赤白帶血冷崩中下血漏胎下血用生薑與艾剉炒合赤色人酒同煎數沸去滓調服洩瀉不止陳米飲服澀尿淋煎通草燈心湯服血暈不知人煎當歸酒調服諸上熱下冷濃煎人參湯服徧身虛腫木氣煎赤小豆湯服產內二毒傷寒及中風角弓反張身如五板硬煎麻黃湯服使被蓋出汗月經不通或閒雜色頻併而下斷續不止飲食無味肌膚瘦劣面赤唇焦乍寒乍熱四肢煩疼五心燥熱黑點徧身血斑赤腫走注及血風勞傷無力用童子小便入薑汁少許調服常服以小便爲妙若恐惡心和以半酒加懷胎人於難月一日一服至産下不覺疼痛或病人服至五服十服日倍飲食是藥功成矣其

功不能具載略述

急用湯使於前

白堊丹治婦人三十六病崩中漏下身瘦手足熱惡風怯寒咳逆煩滿拘急短氣心脇腰背腹肚與子臟相引痛漏下五色心常恐懼遇悲怒憂勞即發皆是內傷所致並皆治之

牡蠣煅研　白堊　禹餘糧煅醋淬九遍研

細辛去苗　烏賊魚骨燒灰　白石脂煅　龍骨煅研各一兩半

瞿麥穗　附子炮去皮臍　芍藥　石韋去毛

白斂　黃連去鬚　茯苓去皮　肉桂去粗皮

白芷　當歸去苗　乾薑炮　人參

甘草炙各一兩　川椒去目及閉口者炒出汗半兩

右為細末煉蜜圓如梧桐子大每服三十圓至五十圓空心溫酒下

人參養血圓 治女人稟受怯弱血氣虛損常服補衝任調血脈宣壅破積退邪熱除寒痺緩中下堅脹安神潤顏色通氣散悶兼治婦人懷身腹中絞痛口乾不食崩傷眩暈及產出月羸瘦不復常者

烏梅肉三兩　熟乾地黃五兩　當歸去苗二兩　人參

川芎　赤芍藥　菖蒲微炒各一兩

右爲細末蜜溲杵數千下圓如梧桐子大
每服五十圓至百圓溫酒米湯下食前服

牡丹散治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心忪煩赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜臥及血熱相搏月水不利臍腹脹痛寒熱如瘧又治室女血弱陰虛榮衛不和痰嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸

乾漆二兩炒　蓬莪朮炮　蘇木　鬼箭各一分
甘草半鹽湯炙半生　當歸　桂心　牡丹皮
芍藥　陳皮去白　紅花　延胡索炒
沒藥別研令細　烏藥各一兩

右為末每服二錢水一
盞煎至七分不拘時服

調中湯治產後腸胃虛怯寒邪所侵及未滿月飲冷當風乘虛襲留於肓膜散於腹脇腹痛作陣或如錐刀所刺流入大腸水穀不化洞瀉腸鳴或下赤白胠脇䐜脹或走痛不定急宜服之

當歸　肉桂去粗皮　川芎　白芍藥

附子炮　良薑各一兩　甘草炙半兩

右為剉散每服三錢匕水
三盞煎至一盞去滓熱服

旋覆湯治產後傷風感寒暑濕欬嗽喘滿痰涎壅塞坐

臥不寧

旋覆花　五味子　前胡　麻黃去節

赤芍藥　半夏麯　杏仁去皮尖麩炒　茯苓去皮

甘草炙　荊芥去梗

右各等分爲粗末每服四大錢水一盞半薑五片棗一枚煎至七分去滓食前服

黑龍丹治證品味與前琥珀黑龍丹同

當歸養血圓治產後惡血不散發歇疼痛及惡露不快臍腹堅脹兼室女經候不匀赤白帶下心腹腰脚疼痛

當歸　延胡索炒　赤芍藥　丹皮各二兩

肉桂一兩

右爲細末蜜圓如梧桐子大溫酒米飲下三十圓食前溫服痛甚細嚼嚥下

阿膠枳殼圓 治產後虛羸大便秘澁

阿膠碎炒　枳殼浸去穰麩炒各二兩　滑石研飛爲衣半兩

右爲末煉蜜圓如梧桐子大每服二十圓溫水下半日來未通再服

失笑散 治產後心腹痛欲死百藥不效服此頓愈

蒲黃炒香　五靈脂酒研淘去沙土各等分爲末

右先用釅醋調二錢熬成膏入水一盞煎七分食前服熱服

增損四物湯 易簡方 治婦人氣血不足四肢怠惰乏力少

氣兼治產後下血過多榮衞虛損陰陽不和乍寒乍熱
並皆服之

當歸　川芎　人參　乾薑炮
甘草炙　白芍藥各等分

右㕮咀每服四錢水一盞煎至六分去滓熱服若產後寒熱腹中刺痛則有敗血當用五積散加醋煎及大聖散服之若所下過多猶有刺痛亦宜服此二藥一方治經血凝滯腹內血氣作疼用四物湯加莪朮官桂等分名六合湯一方治下血不止及妊娠胎動加熟艾乾薑甘草阿膠黃芪等分名膠艾湯一法治血痢止加膠艾治產後血搏口乾煩渴加栝蔞麥門冬煩熱小便澁大便閉加大黃桃仁湯脇脹加厚朴枳實虛煩不得睡加竹葉人參大渴煩燥加知母石膏一方治婦人血虛心腹

疞痛不可忍者去地黃加乾薑名四神湯大
率產後不問下血多少須日進黑神散三服

附產前將護法

按諸家產論云凡產婦入月切忌飲酒
恐產時心神昏亂臨產之時不可令傍
人喧擾大小倉忙慮致驚動產母秖可令熟事產婆
及穩審謹卓老成親密三兩人扶侍產母稍覺腹痛
且宜任意坐臥勉強飲食恐致臨產氣力虛羸若腹
痛漸甚唯宜熟忍仍可按節次漸服滑胎楡白皮散
一二服服藥之法愼勿太早須得其時又傍人不得
逼迫且須令人扶策徐徐而行若行步稍艱卽凭物
而立須臾扶策再行直至腹痛連腰相引作陣痛頻
卽服催生丹一服更且勉强扶行陣痛轉甚難以立
忍是產時將至卽服催生符畢然後安詳上草上草
之時愼勿傷早若太早則子在腹中難以轉側又須
仔細體候直待見逼欲生然後令抱腰也抱腰之人
不得傾斜則見得順其理自然易產也又有臥產者
亦待臥定背平著蓆體不傴曲則子不失其道苟或
不能依此節適必致產難縱或幸免必須嬰生諸疾

產後將護法

按經云婦人非止臨產須憂至於產後大須將理慎勿以產時無他乃縱心恣意無所不犯犯時微若秋毫感病重於嵩岱且纔得分娩切忌問是男是女看血下多少隨證服壓血暈藥良久吃粥服四順理中圓便令人從心下按至臍腹日五七次若有疾證即隨證服藥粥藥相間頻頻服餌且宜閉目而坐背後倚物左右看承常令直立兩膝雖時眠睡頻令換覺過一復時方得上床亦須立膝高搘床頭厚鋪裀褥遮圍四向密塞孔隙恐禦賊風一臘之內常聞醋煙以防暈悶一臘之後漸加滋味或以羊肉雌雞煮濃汁作糜粥宜至百晬常服當歸圓一兩服以養藏氣補血脈滿月之內尤忌任意飲食觸冒風寒恣情喜怒梳頭用力高聲作勞工巧之類及上厠便溺如此節養將攝以至百晬始得氣血和調腑臟平復設此不依即致產後餘疾

[illegible] 正二三四五六七八九十十一十二 所直方位宜

遊方　床戶門灶身灶方廁門戶灶床　自子　修造主損胎

催生符



右件符用水飛硃砂書之貼於房內北壁上遇坐草之時劄於鍼上就燈燒之不得飛揚溫水調服

增廣太平惠民和劑局方卷九　終

治小兒諸疾 外有治療諸方互見各類

返魂丹 治小兒諸風癲癇潮發瘈瘲口眼相引項背强直牙關緊急目睛上視及諸病久虛變生虛風多睡昏困荏苒不解速宜服之

當歸 酒浸切焙微炒　烏犀 鎊各二兩　乾薑 炮　枳殼 去瓤麩炒

白朮 泔浸一宿微炒　人參 去蘆　木香 不見火　茯苓 去皮

丁香 不見火　厚朴 去皮薑汁炙熟　藁本 去土　天竺黃 細研

敗龜 酒醋塗炙黃　何首烏 泔浸一宿煮過切焙　桑螵蛸 微炒

蔓荊子去白　白芷　虎骨酒醋炙令黃　晚蠶蛾微炒
縮砂仁各三分　麻黃去根節　麝香別研　羌活去蘆
羚羊角鎊　半夏湯洗七次薑汁浸三宿焙乾炒黃　川烏頭燒令通紅
留烟少許入坑以盞蓋新土圍食頃　防風去蘆　白花蛇酒浸一宿
炙令熟去皮骨用肉　藿香去土葉　檳榔　白附子微炮
天南星湯洗生薑自然汁煮軟切焙炒黃　白殭蠶去絲嘴微炒
阿膠碎炒　萆薢微炙　肉桂去粗皮　烏蛇酒浸一宿炙熟
取肉用　細辛去苗　陳皮去穰微炒　槐膠
天麻酒洗切焙　沈香不見火　乾蝎微炙　獨活去苗各一兩

肉豆蔻去殼微炒　朱砂細研水飛　雄黃細研水飛　石斛去根
附子水浸後炮去皮臍　牛黃別研　龍腦別研
水銀　蟬殼去土微炒　川芎各半兩　烏鴉一箇去嘴翅足
膩粉一分別研　狐肝三具臘月采取同烏鴉一箇入新甕內以瓦盆蓋頭泥固濟炭火一斤燒令通赤烟盡出候令研細用　硫黃研細用磁盞盛慢火養成汁入水銀急炒如青泥成砂再研半兩　金箔二十片為衣
右如法修治搗研令細煉白蜜合和入酥再搗三五千下圓如梧桐子大每一歲兒一圓溫薄荷自然汁化下不計時候

定命丹　治小兒急慢驚風天弔撮口潮發搐搦妳癎壯

熱昏塞不省

青黛研半錢　蟬酥乾者酒浸一宿一錢　乾蝎全者七箇微炒

麝香研一匙　白附子炮為末半分　天南星炮為末一分

右件細研令勻以粟米粥和圓如菉豆大別以青黛為衣每服一圓荊芥薄荷湯化下後困睡無疑但有患者先化半圓滴入鼻中嚏噴者必差一本不用天南星

人參散治小兒驚風壯熱精神昏憒嘔吐痰涎驚悸恍惚或發瘈瘲目睛上視

甘草炒　天麻去蘆　朱砂研飛　南星牛膽製各五兩

牛黃研一分　天漿子微炒三百五十個　膩粉

雄黃飛各一兩一分　銀箔七十片爲衣

右爲細末入研藥勻煉蜜爲圓如豌豆大以銀箔爲衣每服一歲兒服一圓薄荷湯化下疾證未退可再服之更量兒大小加減奶食後服

太一銀朱丹治小兒驚風壯熱涎盛發癇手足搐搦目睛上視及風壅實心膈滿悶嘔吐痰涎大便秘澀

黑鉛煉十徧秤三兩與水銀結砂子分爲小塊同甘草水煮半日候冷取出研去草不用

水銀結沙子　鐵粉各三兩　甘草十兩同鉛煮

天南星炮爲末三分　硃砂飛研半兩　膩粉研一兩

右同研勻以麪糊爲圓如麻子大每一歲小兒服一圓薄荷蜜湯下以微利爲度如未利再服乳食後

鶴頂丹 治大人小兒風壅痰實咽膈不利口乾煩渴睡臥不安及中暑頭痛躁渴不解

麝香研二兩半　硃砂研飛一百兩　牙硝枯研一百二十五兩

寒水石粉一百一十兩　甘草炒爲末三十五兩

右合研勻煉蜜溲和每一兩二錢作十圓大人溫生薑水化下一丸如治中暑入生龍腦少許同研細新水化下小兒一丸分四服更量大小加減又治小兒臟腑積熱心神不寧夜臥狂叫口舌生瘡用薄荷自然汁化下並食後服

【金蟾丹】治一切驚風天吊目睛上視手足搐搦狀候多端用藥一圓用溫水化滴鼻中令噴嚏三五次更用薄荷湯下二圓即愈如久患五疳腹脹頭大四肢瘦小好喫泥土可思嬭食愛咬指甲時撏眉毛頭髮稀疏肚上青筋及久患瀉痢並用米飲下二圓如久患疳蛔咬心發歇疼痛並以苦楝子煎湯下二圓如鼻下赤爛口齒疳蟲并口瘡等用兒孩子嬭汁研二圓塗在患處疳眼雀目用白羊子肝一枚以竹刀子批開入藥二圓在內以麻縷纏定用淘米泔煮熟空心食之仍令乳母常忌

毒魚犬蒜雞鴨猪肉等

熊膽用溫水化入藥　蘆薈研　膩粉同水銀研　硃砂研飛各一兩

麝香研各半兩　蟾酥乾者酒浸一宿　龍腦研　鉛霜研各一匙

雄黃研飛　青黛研　胡黃連各二兩　白附子炮二錢

水銀一錢與膩粉同研不見光星

右為末入研藥勻用熬過獖猪膽汁浸蒸餅為圓如黃米大湯使如前此藥退驚治風化蟲殺疳除百病進乳食若隔三兩日進一服永無病不染橫天之疾凡有患與服必功効

五福化毒丹治小兒蘊積毒熱驚惕狂躁煩赤咽乾口舌生瘡夜臥不寧譫語煩渴頭面身體多生瘡癤

桔梗微炒　元參洗焙各六兩　青黛研　牙硝枯各二兩

人參去蘆二兩　茯苓去皮五兩　甘草炒一兩半　銀箔八片爲衣

麝香研半錢　金箔八片爲衣

右爲細末入研藥勻煉蜜爲圓每兩作十二圓每一歲兒一圓分四服用薄荷水化下及瘡疹後餘毒上攻口齒涎血臭氣以生地黃自然汁化一圓用雞翎掃在口內熱疳肌肉黃瘦雀目夜不見物陳粟米泔水化下食後臨臥服

靈砂歸命丹 治小兒蘊積邪熱潮熱不除頰赤口乾心膈煩躁痰涎不利睡臥不安或發驚癇涎潮搐搦又療積滯不消下利多日腹中疞痛煩渴嘔噦服藥調和不

能愈者並可服之

巴豆去心膜皮炒熟研如麪去油三百十五粒　牛黃研　龍腦研

麝香研　膩粉研各三兩　辰砂研飛九兩　金箔研九十片

右合研勻煉黃蠟六兩入白沙蜜三分同煉合勻爲圓如菉豆大每服二圓金銀薄荷湯下更量歲數加減如驚癇搐搦用龍腦膩粉蜜湯下服藥先以冷水浸少時服之見效尤速

大天南星圓治小兒急慢驚風涎潮發搐目睛上視口眼相引牙關緊急背脊強直精神昏塞連日不省

天南星牛膽製者半兩　龍腦研　牛黃研

乳香研各一錢　人參　天麻去蘆　防風去蘆各三兩

朱砂研三錢 乾蝎十四個湯浸潤去土微炒爲末 麝香研一錢半

右件研杵令勻煉蜜和圓如大雞頭大每服一圓荆芥薄荷湯化下量兒大小以意加減服不計時候

五疳保童圓 治小兒五疳蓋其骨肉輕軟腸胃微細若乳哺有節則臟腑相調或乳母寒溫失理飲食無常醉飽喜怒及小兒百晬以後五歲以前乳食漸多不擇生冷好餐肥膩甘酸之物即成五疳一曰肝疳其候搖頭揉目白膜遮睛流汗徧身合面而臥目中澀痒肉色青黃髮立頭焦筋青腦熱腹中積聚下痢頻多久而不瘥

轉甚羸瘦二曰心疳其候渾身壯熱吐痢無常頰赤面黃胸膈煩滿鼻乾心躁口舌生瘡痢久不瘥多下膿血有時盜汗或乃虛驚三曰脾疳其候腹多筋脈喘促氣麄乳食不多心腹脹滿多啼欬逆面色萎黃骨立毛焦形枯力劣胸膈壅悶水穀不消口鼻常乾好吃泥土情意不悅愛暗憎明腸胃不和痢多酸臭四曰肺疳其候欬嗽氣逆皮毛乾焦饒涕多啼咽喉不利揉鼻咬甲壯熱憎寒口鼻生瘡唇邊赤痒腹內氣脹乳食漸稀大腸不調頻頻泄痢糞中米出皮上粟生五曰腎疳其候肌

肉消瘦齒斷生瘡寒熱作時口鼻乾燥腦熱如火腳冷如冰吐逆既增乳食減少瀉痢頻併下部開張肛門不收痔瘡痒痛已上疾狀並皆治療

黃連去鬚　白鱔頭炙令焦黃無即炒白蕪荑充代　草龍膽去蘆

雄黃飛研　青橘皮去穰　夜明砂微炒　五倍子

蟾頭一枚炙令黃色　苦楝根　天漿子微炒　胡黃連

麝香　青黛研　熊膽研　蘆薈研各一分

右為細末都研令勻用糯米飯和圓如麻子大每服一歲兒一圓不計時候溫米飲下日進三服尤妙○一方有蝸牛微炒一分

【虎睛圓】治小兒驚風壯熱痰涎壅滯精神昏憒睡多驚啼或發搐搦目睛直視

茯神去木　天麻去苗　膩粉研　天竺黃研

胡黃連各五兩　白附子炮　麝香研各三兩　朱砂研飛二兩

天南星炮三兩　天漿子微炒四十個　使君子一百個

青黛研七兩

右爲細末以麪糊爲圓如梧桐子大每一歲兒服一圓薄荷湯化下更量虛實加減乳食後服

【化蟲圓】治小兒疾病多有諸蟲或因腑臟虛弱而動或因食甘肥而動其動則腹中疼痛發作腫聚往來上下

痛無休止亦攻心痛呌哭合眼仰身撲手心神悶亂嘔噦涎沫或吐清水四肢羸困面色青黃飲食雖進不生肌膚或寒或熱沈沈嘿嘿不的知病之去處其蟲不療則子母相生無有休止長一尺則害人

胡粉炒　鶴虱去土　檳榔　苦楝根去浮皮各五十兩

白礬枯十二兩半

右爲末以麪糊爲圓如麻子大一歲兒服五圓溫漿水入生麻油一兩點打勻下之溫米飲下亦得不拘時候其蟲細小者皆化爲水大者自下

進食丸 治乳食不消心腹脹滿壯熱喘粗嘔吐痰逆腸

續修四庫全書

嗚泄瀉米穀不化或下痢赤白腹痛後重及食癥乳癖
痃氣痞結並皆治之

代赭石燒醋淬研 當歸去蘆微炒 朱砂研飛 枳殼去瓤麩炒微黃
木香各半兩 麝香細研一分 巴豆霜半分

右件藥擣羅為末入研藥勻麪糊為圓如麻子大
每一歲兒服一圓溫米飲下更量虛實加減服之
食後
服

[illegible] 治小兒風壅痰熱心神不寧驚悸煩渴唇
焦頰赤夜臥不安譫語狂妄

紫河車用黑豆煮軟切作片焙乾二十五兩 山藥一百五十兩 牙硝枯十五兩

甘草（爁） 人參（去蘆） 茯苓（去皮各五十兩） 朱砂（研飛一百兩）
龍腦（研十兩） 麝香（研五兩） 金箔（一千二百片爲衣）
右爲細末煉蜜爲圓每一兩半作五十圓以金箔爲衣每服一圓薄荷湯化下含化亦得食後臨臥服常服安鎮心神散敗邪熱涼咽膈止驚啼

比金圓 治小兒驚風體熱喘麄涎嗽心忪煩赤大小便不利夜臥不穩

天南星（炮十二兩半） 滑石 膩粉（研各十五兩）
青黛（研二兩半） 巴豆（七百個去皮取霜）
右爲細末以麪糊爲圓如麻子大每服一歲一圓薄荷溫水下加急驚風頭熱足冷口噤面青筋脈

抽掣上膈頑涎疾狀甚者加一兩圓煎桃符湯下
疎利下蘊毒熱涎立便安愈小兒瘡疹後餘毒不
解宜與
服食後

香連丸 治小兒冷熱不調泄瀉煩渴米穀不化腹痛腸鳴或下痢膿血裏急後重夜起頻併不思乳食肌肉消瘦漸變成疳

白石脂　龍骨　乾薑炮　黃連去鬚微炒
白礬煅各半兩

右件藥搗羅爲末醋煮爲糊和圓如麻子大每一歲兒服十圓米飲下乳食前服如煩渴煎人參湯下更量兒大小以意加減日三四服

開胃圓 治小兒腑臟怯弱內受風冷腹痛脹滿腸鳴泄利或青或白乳食不化又治臟冷夜啼胎寒腹痛

白芍藥 麝香細研各一分 人參 木香

蓬莪朮煨 白朮 當歸去苗微炒各半兩

右件搗羅為末都研令勻湯浸炊餅和圓如黍米大每服十五圓溫米飲下新生兒腹痛夜啼可服五圓並乳食前服

沒石子圓 治小兒腸虛受熱下痢鮮血或便赤汁腹痛後重晝夜不止徧數頻多

沒石子 地榆各半兩 黃蘗剉蜜炒二兩 黃連剉炒一兩半

酸石榴皮一兩

右件搗羅為細末以醋煮麪糊和圓如麻子大每服十圓至二十圓溫米飲下食前服

牛黃圓 治驚化涎涼膈鎮心祛邪熱止痰嗽

蛤粉研飛二百兩　牙硝枯研　朱砂研飛各十兩　人參二十五兩

雄黃研飛七十五兩　龍腦研四兩　甘草爁五十兩　金箔銀箔各二百片為衣

右為細末煉蜜溲和每一兩八錢作二十圓以金箔銀箔為衣一歲兒每服如菉豆大薄荷溫水化下量歲數臨時加減服之食後

[illegible]辰砂膏 治小兒心經邪熱頰赤多渴睡臥不寧譫

語狂妄痰涎不利精神恍惚及大人痰熱蘊積心膈煩躁咽喉腫痛口舌生瘡

牙硝枯研　鐵粉研各半兩　甘草炙二兩　龍腦研二錢

辰砂研飛三兩　蛤粉研飛八兩　人參一兩　金箔三十片為衣

右為細末煉蜜溲和每一兩半作二十丸捏扁用金箔為衣每服半皂子大大人一圓分作兩服並用薄荷湯化下

食後臨臥服

潤肺散 治小兒寒壅相交肺氣不利欬嗽喘急語聲不出痰涎壅塞胸膈煩滿鼻塞淸涕咽喉乾痛

貝母去心麩炒黄　杏仁湯去皮尖及雙仁者焙乾麩炒各二兩半　麻黄去根節

人參各二兩　阿膠炒令黃燥　桔梗各半兩　陳皮去白一分

甘草炙一兩

右同杵羅為粗末每服一錢水八分煎六分去滓溫服食後

惺惺散治小兒風熱瘡疹傷寒時氣頭痛壯熱目澀多睡咳嗽喘麄鼻塞清涕

瓜蔞根　人參　細辛去葉　茯苓去皮

白朮　甘草炙　桔梗各一兩半

右件同杵羅為末每服一錢水一小盞入薄荷三葉同煎至四分溫服如要和氣即入生薑煎服不計時

清涼飲子 治小兒血脈壅實腑臟生熱頰赤多渴五心煩燥睡臥不寧四肢驚掣及因乳哺不時寒溫失度令兒血氣不理腸胃不調或溫吐連滯欲成伏熱或壯熱不歇欲發驚癇又治風熱結核頭面瘡癤目赤咽痛瘡疹餘毒一切壅滯並宜服之

當歸去蘆酒浸　甘草炙　大黃蒸焙　赤芍藥

右等分為麄末每服一錢水一中盞煎至七分去滓溫服量兒大小虛實加減微溏利為度食後臨臥服

天竺飲子 治大人小兒腑臟積熱煩躁多渴舌頰生瘡

咽喉腫痛面熱口乾目赤鼻衄丹瘤結核癰瘡腫痛又
治伏暑躁熱瘡疹餘毒及大便下血小便赤澀

川鬱金用皂角水煮切作片焙乾　甘草炙各二十兩　連翹

大梔子仁微炒各二十兩　瓜蔞根十斤　雄黃飛研五兩

右爲細末每服一大錢食後臨臥用新水調服小兒半錢臨時更量兒大小以意加減

朱砂圓鎮心神化痰涎利咽膈止煩渴

鵬砂研一分　朱砂研飛五十兩　梅花腦研　麝香研各半兩

腦子研　牙硝枯各一兩　寒水石燒通紅研四兩

甘草浸汁熬膏五斤

右研勻用甘草膏和每兩作一百圓每服一圓含化小兒夜多驚啼薄荷水化下

太一丹 治小兒諸風驚癎潮發搐搦口眼相引項背強直精神昏困痰涎不利及一切虛風並皆治之

天南星炮 烏蛇酒炙取肉各三錢 天麻去蘆酒浸一宿 麻黃去根節各半兩 乾蝎微炒一錢半 白附子炮三錢半 白殭蠶去絲嘴炒四錢 附子炮去皮臍半兩

已上爲細末以水一升調浸三日以寒食麪一斗拌勻蹹作麯須六月六日以楮葉罨七日取出逐片用紙袋盛掛當風十四日可用每麯末一兩入下項藥

琥珀研一錢 辰砂研飛六錢 雄黃研飛三錢 甘草炙爲末半錢

右合研勻煉蜜和圓如雞頭大每服一丸溫水化下不計時

大驚圓治驚風諸癇壯熱昏憒神志恍惚痰涎壅塞或發搐搦目睛直視並皆治之

蛇黃火煅醋淬九次研飛二錢　青礞石研一錢　朱砂研飛三錢

蝦蟆灰　雄黃各一錢半　鐵粉研二錢半

右研勻以水浸蒸餅丸如桐子大每服一丸煎薄荷水磨剪刀服化下日二三服此藥治驚化涎不用銀粉小兒臟腑口齒腸胃柔弱凡用銀粉藥切須慎之則無他苦

紹興續添方

睡驚丹治小兒驚邪風熱痰壅咽膈不利夜臥不安睡

中啼哭驚風搐搦

蛇黃火煅紅米醋淬五徧再將醋煮乾為度　天南星研為粉用薄荷汁溲和為餅炙熟

茯苓去皮　鐵粉重羅　使君子仁

已上五味搗羅為末各秤半斤

腦子別研半兩　麝香別研一兩　銀箔研　金箔研各一百片

右前項五味藥末入後項研藥拌勻糯米糊為丸如皂莢子大朱砂為衣用薄荷湯磨下五歲兒一丸分二服三歲已下兒一丸分三四服更量歲數加減常服安神鎮心定驚控痰

使君子圓　治小兒五疳脾胃不和心腹膨脹時復疙痛不進飲食漸致羸瘦並宜服之

使君子仁浸去黑皮一兩　厚朴去皮薑汁炙　陳皮去白

川芎各一

右爲細末煉蜜圓如皂子大三歲以上一粒以下半粒陳米飲化下大治小兒腹痛

加減四君子湯治小兒吐瀉不止可進乳食常服調胃進食

白藊豆蒸熟焙乾　藿香葉　甘草炙　黃芪去苗各一兩

人參　茯苓去皮焙　白朮各四兩

右爲細末每服一錢入鹽點服或用水七分盞煎五分溫服

消毒犀角飲治證并方見前積熱類

寶慶新增方

肥兒圓治小兒疳病者多因闕乳食吃太早所致或因久患臟腑胃虛蟲動日漸羸瘦腹大髮豎不能行步面黃口臭發熱面無精神此藥殺蟲進食

神麴炒　黃連去鬚各十兩　肉豆蔻麵裹煨　使君子去皮

麥蘖炒各五兩　檳榔不見火細剉二十個　木香二兩

右為細末猪膽為丸如粟米大每服三十丸量歲數加減熱水下空心服○一方黃連神麴使君子各一兩檳榔肉豆蔻各半兩木香二錢　糊丸如蘿蔔子大熟水吞下

挨積圓治小兒脾胃不和宿滯不化腹脹腸鳴嘔逆惡

心便利不調乳食減少或疳瀉積瀉大便酸臭亦治丈夫婦人胸膈不快酒積食積嘔逆惡心吐瀉脾疼

京三稜炮　丁皮不見火各三兩　丁香不見火　青皮去白各一兩

乾薑炮　巴豆去皮膜開各二錢半

右件爲細末入巴豆拌匀麪醋糊爲丸如粟米大每服五十圓至六十丸二歲兒可服七丸至十丸生薑湯呑下熟水亦得不拘時候更量兒歲數加減與之此藥不用大黄硼砂蒸粉之類並是性温之藥常服消積滯進乳食退黄長肌

急風丹 治小兒傷風鼻塞清涕酒調塗顖門上不可服方見諸風類

淳祐新添方

助胃膏 治小兒胃氣虛弱乳食不進腹脇脹滿腸鳴泄瀉哯乳便青或時夜啼胎寒腹痛、

白豆蔻仁　肉豆蔻煨　丁香　人參

木香各一兩　白茯苓去皮　官桂去粗皮　白朮

藿香葉　縮砂仁　甘草炙各二兩　橘紅去白

山藥各四兩

右爲細末煉蜜和成膏每服如雞頭實大一丸量兒大小加減米飲化下不拘時候

觀音散 治小兒外感風冷內傷脾胃嘔逆吐瀉不進乳

食人漸羸弱大抵脾虚則瀉胃虚則吐脾胃俱虚吐瀉不已此藥大能溫養脾胃進美飲食全蝎觀音散見後

人參一兩　石蓮肉炒去心一分　茯苓一半

神麴炒二錢　綿芪　白芷　木香炮

甘草炙　白扁豆去皮炙焦黃去火毒各一錢

右為細末每服一錢水一小盞棗一枚藿香三葉煎四分去滓溫服量兒大小加減

小抱龍圓治傷風瘟疫身熱昏睡氣粗喘滿痰實壅嗽及驚風潮搐蠱毒中暑並可服之壯實小兒宜與服之

天竺黃一兩　雄黃水飛二分　辰砂別研　麝香別研各半兩

天南星臘月釀黃牛膽中陰乾百日者如無只以生者去皮臍剉炒熟用四兩

右爲細末煮甘草水和丸如皂子大每服一丸溫水化下百晬內者作三服或用臘雪水煮甘草和藥丸佳

鈎藤膏 治小兒胎寒胃冷腹肚疞痛夜間啼哭嘔吐乳食大便瀉青狀若驚搐時有冷汗

薑黃二錢　沒藥別研　乳香別研　木香各四錢

右爲細末煉蜜和成膏每服三歲兒一丸如雞頭實大煎鈎藤湯化下更量大小加減不拘時候

吳直閣增諸家名方

蟬蛻圓 治小兒五疳八痢乳食不節寒溫調適乖違髮

竪毛焦皮膚枯悴腳細肚大顱解胸陷漸覺尩羸時發寒熱盜汗欬嗽腦後核起腹內塊生小便泔濁腹痢濺青撏眉咬指喫土甘酸吐食不化煩渴併頻心神昏瞀鼻赤唇燥小蟲既出蛔蟲咬心疳眼雀目名曰丁奚此藥救療效驗如神

白蕪荑去皮　黃連去鬚　蚵蚾酒浸去骨焙　胡黃連各一兩半

青黛半兩為衣

右件碾為細末豬膽汁[illegible]糊丸如粟米大每服三十丸用飯飲吞下食後臨臥日進三服

高良薑散治小兒冷傷脾胃不和腹脹氣悶不欲飲食

高良薑 草豆蔻去皮 陳皮去白 當歸微炒

肉桂去粗皮各一分 人參去蘆半兩

右件搗羅爲散三歲兒每服一錢水一盞煎至五分去滓溫服不計時候量兒大小加減服之

人參圓治小兒乳哺飲冷過度傷冷脾胃腸脇脹滿多吐痰涎

人參 丁香 陳皮去白 乾薑炮

白朮各一分 半夏湯洗七次半兩

右件搗羅爲末煉蜜和圓如麻子大每三歲兒服十圓溫湯下不拘時日二服量兒大小加減

白豆蔻散治小兒脾胃不和增寒壯熱腹痛嘔吐不納

乳食

枇杷葉去毛微炙　白豆蔻去皮　陳皮去白　芎藭

甘草炙各一分　乾木瓜　人參　黃芪各半兩

右爲粗散三歲小兒每服一錢水一小盞生薑錢子三片棗一枚同煎至七分去滓溫服服不計時候量兒大小加減

厚朴散治小兒外感風冷壯熱增寒頭痛體重中寒氣逆嘔吐惡心或手足厥冷及脾胃不和並皆治之

蒼朮米泔浸一宿去黑皮焙　厚朴去皮薑汁炙　陳皮去白各一兩

乾薑炮三分　甘草炙半兩

右件爲細末三歲小兒每服一錢水一小盞入生薑錢二片棗子一枚同煎至五分濾去滓熱服

柴胡散 治小兒傷寒壯熱頭痛體疼口乾煩渴

石膏　黄芩　甘草　赤芍藥

葛根各一兩　麻黄去根節　柴胡去苗各半兩

右搗羅爲散三歲小兒每服一錢水一小盞入生薑少許葱白三寸豉二十粒同煎至五分濾去滓溫服不計時候汗出爲效量兒大小加減

葛根散 治小兒傷寒四肢煩熱頭疼體痛心躁口乾發渴

葛根　麻黄去根節　人參各半兩　肉桂去粗皮

甘草各一分

右件搗爲粗散三歲兒每服一錢水一小盞入生薑少許棗子一枚同煎至五分濾去滓溫服量兒大小加減不計時候

人參散治小兒傷寒作熱常服調順陰陽和養脾胃定吐逆止煩渴　品味與前人參圓同

爲散三歲兒每服一錢水一小盞煎五分溫服量兒大小加減

豆蔻香連圓治小兒乳食不節腸胃虛弱冷熱之氣客於腸間下赤白痢腸內疞痛日夜頻併不欲飲食量大小加減服之

黃連去鬚微炒三分 肉豆蔻仁二枚 丁香一分 木香

訶黎勒炮去核各半兩

右擣羅為末以粟米粥和丸黍米大三歲兒服十丸粥飲下

龍骨圓 治小兒赤白久痢日夜頻併腹痛羸弱不欲飲食

黃連去鬚微炒 黃蘗 白龍骨 訶黎勒皮

木香各一分 當歸微炒 乾薑炮 白礬枯研各半兩

胡粉三分微炒黃

右件擣羅為末煉蜜和圓如菉豆大三歲兒每服十圓溫米飲下日三服量兒大小臨時加減

烏梅散 治小兒下痢後津液減少臟腑虛燥煩渴引飲及治諸病煩渴引飲無度

烏梅肉（微炒 半兩）　白茯苓　乾木瓜（各一兩）

右搗羅爲粗散三歲兒每服一錢水一小盞入生薑錢一片煎至五分去滓溫服不計時候服量兒大小加減

白芨散 治小兒腎氣不成腦髓不足小兒年大骨應合而不合頭縫開者是也宜以藥塗之

白芨　栢仁　防風（去苗）　細辛（去葉各一兩）

右爲細末每一錢以乳汁調塗在兒顱骨上每日一次用之

附子散 治小兒大腸虛冷肛門脫出多因下痢得之宜以藥傅

附子生去皮 龍骨各一兩

右搗羅爲細散每用一錢傅在脫肛上按令入頻用之

赤石脂散 治小兒因痢後躽氣下推出肛門不入

伏龍肝 赤石脂各等分

右件細研爲散每用半錢傅腸頭上每日三上用

朱礬散 治小兒初生鵝口其舌上有白屑如米屑者鼻外亦有并不能乳

朱砂細研 白礬枯各等分

右件藥研極細每用少許傅兒舌上每日三次用之先使亂髮頻揩舌上垢令淨卽差

益黃散 治小兒脾胃虛弱腹痛泄痢不思乳食嘔吐不止困乏神懶心腸膨脹顏色青黃懨懨不醒

丁香四錢不見火 陳皮去白二兩 甘草爁 訶子炮去核

青皮去白各一兩

右爲細末每服一大錢水七分盞煎至五六分食前進量大小加減與服此藥極有神效不可盡述

錢氏白朮散 治小兒脾胃久虛嘔吐泄瀉頻併不止津液枯竭煩渴多躁但欲飲水乳食不進羸困少力因而

失治變成風癇不問陰陽虛實並宜服之

人參 白朮不見火 木香不見火 藿香去土梗

白茯苓去黑皮 甘草炙各一兩 乾葛剉二兩

右爲粗末每服一錢水一小盞煎至半盞去滓通口服不拘時更量兒大小加減渴甚者併煎任意飲之

續添諸家經驗秘方

全蝎觀音散治證與前觀音散同

石蓮肉炒去心 白扁豆炒 人參各二兩半 神麴炒二兩

全蝎 羌活 天麻去苗 防風去苗

黃芪（揰扁蜜刷炙） 木香（炮） 白芷 甘草（炙各一兩）

茯苓（去皮一兩半）

右為細末嬰兒一匙二三歲半錢四五歲一錢用水一盞或半盞棗子半個或一個同煎至七分去滓服不拘時候

鎮心至寶丹 治小兒一切驚風搐搦壯熱涎多魚口鵶聲眼睛直視

天南星（煨） 白附子（炮） 雄黃（研） 全蝎（各半兩）

白殭蠶（去絲嘴炒） 鬱金（各一兩） 龍腦（研） 麝香（研各二錢半）

辰砂（研一分） 膩粉（二錢） 滑石（末二兩）

右爲細末煉蜜爲圓如皂筴子大金銀箔爲衣每服一丸食後臨臥薄荷湯下常服鎮心神涼咽膈

蛇黄圓治小兒急慢驚風手足抽掣眼睛直視角弓反張證候危急者

蛇含石十個煆三度醋淬卻用甘草湯煮出酸氣研飛爲細末　鐵腻粉二兩

花蛇頭十個酒浸用齒并肉　五靈脂酒浸去砂　神砂炒

蝎梢　白附子炮　鬱金炮各二兩　龍腦別研半兩

麝香研一兩

右爲細末麪糊爲圓如雞頭大每服一丸薄荷自然汁磨以井花水化開量兒大小加減與服

五疳消食圓治小兒五疳八痢殺腹臟蟲療疳勞及走

馬牙齒唇爛肚大青筋此藥大能進食悅顏色長肌膚

麥蘖　使君子去皮炒　黃連去鬚微炒　橘紅焙

草龍膽　蕪荑

右等分為細末粟米糊為丸如粟米大每服二三十圓空心米飲吞下不拘時候量兒歲數加減

麥煎散治小兒夾驚傷寒吐逆壯熱表裏不解氣粗喘急面赤自汗或狂言驚叫或不語無汗及癮疹徧身赤痒往來潮熱時行麻豆疴子餘毒未盡渾身浮腫痰涎欬嗽或變急慢驚風手足搐搦眼目上視及傷風痰喘頭疼並皆治之

知母　地骨皮揀淨　赤芍藥　甘草炙

石膏　葶藶子　白茯苓去皮　杏仁去皮尖麩炒

人參　滑石各半兩　麻黃去根節一兩半

右爲細末每服一錢麥子煎湯調下如初生牙兒感冒風冷鼻塞身熱噴嚏多啼每一匙許並用麥子煎湯下

秘傳神仙消痞圓治小兒一切痞疾皆因寒溫不調乳哺失節或啖生冷菓子枯食等物脾胃微弱不能消化致五臟不利三焦壅滯結塊腹內堅硬如石或發作寒熱有如瘧證不能飲食漸致羸瘦急宜服之

班猫二十個去頭足翼用糯米半升同炒候米焦黃色爲度去米不用

巴豆去皮取霜二十粒

右先將班猫研爲細末卻入巴豆霜同研令勻用米糊爲圓如小菉豆大小兒三歲已前每服三圓五更初茶清下更量歲數虛實加減與服此藥神妙

銀白散治小兒百病如慢驚搐搦用麝香飯飲調下急驚定後用陳米飲調下驚吐不止丁香湯調下天柱倒腳軟濃米飲調下夾驚傷寒薄荷葱白湯調下疳氣肚脹氣急多渴百合湯調下渾身壯熱面赤驚叫金銀薄荷湯調下赤白痢不思乳食薑錢三片棗子三枚煎湯

調下吃食不知饑飽不長肌肉炒麥芽一撮同生薑煎湯調下暴瀉紫蘇木瓜湯調下神形脫言語不正及大人吐瀉藿香湯調下諸病後無精神少氣力不思食煎生薑棗湯調下稟受氣怯小兒可每日一服最妙

升麻　知母　甘草炙　白扁豆

山藥　人參　茯苓去皮　白朮各等分

右為細末每服一錢湯使如前常服沸湯點不計時

磨積圓治小兒臟腑怯弱內受積冷脇肋脹痛嘔吐痰逆腸鳴泄瀉日夜頻併四肢困倦面無顏色肌肉消瘦

不進飲食及疳氣羸瘦肚大青筋口乾煩渴小便白濁食不生肌或發虛腫寒熱往來或因食甘肥蟲動作痛叫哭合眼並能治之

乾漆 炒一兩　京三稜 炮　青皮 去白各六兩　丁香 一兩

蓬朮 半斤

右為細末水糊為丸如粟米大每二歲兒可服五丸淡薑湯吞下不拘時候更量歲數虛實加減與之

龍膽圓 治疳病發熱

龍膽草 去蘆　黃連 去鬚微炒　使君子 去皮炒　青皮 去白

右等分爲細末猪膽汁和爲丸如蘿蔔子大每服二十丸以意加減臨臥熟水下

諸湯

豆蔻湯治一切冷氣心腹脹滿胸膈痞滯噦逆嘔吐泄瀉虛滑水穀不消困倦少力不思飲食

丁香枝杖七斤　肉豆蔻仁麪裹煨八斤　甘草炒十一斤　白麪炒六斤

右炒鹽十三斤同爲末每服一錢沸湯點服食前

木香湯治胸膈痞塞心腹刺痛脇肋脹滿飲食減少噫氣吞酸嘔逆噎悶一切氣疾並皆治之

木香　青皮各三斤　薑黃　麥蘖炒各五斤

甘草炒　鹽炒各十一斤　蓬朮四斤

右為末每服一錢沸湯點服不計時候

桂花湯治一切冷氣心腹刺痛胸膈痞悶脇肋脹滿嘔逆惡心飲食無味

乾薑炮九兩　縮砂仁三斤十四兩　桂心

甘草炒各九斤

右炒鹽十四斤同為末每服一錢沸湯點服食前

破氣湯治一切冷氣攻心腹脇肋脹滿刺痛噫氣吞酸

嘔逆惡心胸膈噎塞飲食減少

青皮不去白　陳皮不去白　茴香揀炒各十二兩　鹽炒四斤

桂心一斤　良薑炒　薑黃　蓽澄茄

木香各六兩　甘草炒八斤半　杏仁去皮尖麩炒別搗一斤

丁香皮九兩

右爲末每服一錢沸湯點食前服

茴香湯治一切冷氣痰逆惡心胸膈痞悶臍腹撮痛口苦無味飲食不美

阿魏麪裹煨　茴香揀淨炒各三斤　檀香一斤半　胡椒九兩

乾薑炮一斤半　杏仁去皮尖麩炒別搗三斤十二兩　白麪炒六兩

白粳米炒一斗六升　甘草炒十斤　鹽炒二十三斤半

右爲末每服一錢沸湯點服食前

棗湯治脾胃不和乾嘔惡心腹脇脹滿不美飲食

棗去核一斤　生薑洗切五兩　甘草炙剉三兩

右三味一處拌勻用盆器盛貯以布蓋罨一宿焙乾搗爲末每服每錢入鹽少許以沸湯點服常服健脾胃順氣進食

二宜湯治冒暑引飲冷熱不調泄瀉多渴心腹煩悶痢下赤白腹痛後重

桂心四斤四兩　乾薑砂炒四斤　甘草砂炒三十斤

杏仁去皮尖砂炒四斤四兩别研

右爲末每服一錢沸湯點服如傷暑煩渴新水調下不計時

五味湯 溫中益氣治胸膈痞滿心腹刺痛短氣噎悶欬嗽痰唾嘔逆惡心不思飲食

五味子洗九斤　良薑炒　陳皮去白　茴香炒一斤

甘草炒十七斤半　鹽炒二十二斤

右爲末每服二錢沸湯點服食前

仙朮湯 辟瘟疫除寒濕溫脾胃進飲食

蒼朮去皮四十八斤 棗去核二斗四升 杏仁去皮尖麩炒別搗六斤
乾薑炮十兩 甘草炒十四斤 鹽炒二十五斤
右為細末入杏仁和勻每服一錢沸湯點
服食前常服延年明目駐顏輕身不老

茴香湯 療元臟氣虛冷臍腹脹滿㽲刺疼痛不思飲食
一切冷氣並皆治之
茴香去土炒六升 川楝子洗炒 陳皮炒十二斤 甘草炒七斤
鹽炒一斤
右為末每服一錢如茶點吃常
服溫中益氣利胸膈進飲食

寶慶新增方

[illegible]湯治精神不爽頭目昏眩心忪煩躁志意不定

川芎不見火　白芷不見火各二兩　桔梗焙三十兩　檀香不見火二兩

甘草炒六兩

右為細末每服一錢入鹽少許沸湯點服常服調中順氣安神定志清爽頭目

縮砂湯治一切冷氣心腹刺痛胸膈痞悶脇腹脹滿嘔逆惡心飲食無味脾胃不和酒食多傷嘔吐不止

縮砂仁不見火　甘草炒各十兩　桔梗焙六十兩　丁皮不見火六兩

右為細末每服一錢入鹽少許沸湯點服食前常服消滯氣寬胸膈健脾胃進飲食止嘔吐

撾脾湯治脾胃不快宿酲留滯嘔吐酸水心腹脹痛不思飲食傷冷洩瀉並宜服之

麻油四兩　良薑十五兩　茴香炒七兩半　甘草十一兩七錢

右炒鹽一斤同藥炒爲細末每服一錢白湯點下常服快氣大解中酒美進飲食

小異中湯治脾胃不和中寒上衝胸脇逆滿心腹疠痛飲酒過度痰逆惡心或時嘔吐心下虛脹隔塞不通飲食減少短氣羸困溫中逐水去濕又治腸胃冷濕泄瀉注下水穀不分腹中雷鳴霍亂吐利手足厥冷胸痺心痛逆氣結氣並皆治之

蒼朮米泔浸焙五兩 生薑五斤 甘草生用十兩 鹽炒十五兩

右剉碎同研淹一宿焙乾研爲細末每一錢沸湯點空心服

續添諸局經驗秘方

白梅湯 治中熱五心煩燥霍亂嘔吐口乾煩渴津液不通

白梅二十九斤 檀香十兩 甘草十三斤半 鹽炒十五斤

右爲末每一錢擦生薑新水下酒後乾噦惡心舌澁如茶吃

三倍湯 治脾胃不和胸膈悶滿飲食不化嘔逆惡心或霍亂嘔吐心腹刺痛腸鳴泄痢水穀不分

草豆蔻仁二兩　甘草一兩　生薑五兩　鹽炒五兩

右件拌和勻入磁器內淹一宿焙乾爲末沸湯點服

[illegible]湯 治胃氣不和心腹疼痛飲酒過度嘔噦惡心脾疼翻胃內感風冷腸鳴泄瀉婦人血氣刺痛並皆治之

香附子六兩　桔梗一斤半　甘草一斤　乾薑半斤

肉桂去粗皮四兩　茴香半斤　良薑　陳皮各十二兩

右除肉桂外同炒爲細末每服一錢入鹽少許沸湯點下常服快氣不拘時候服

快湯 大治脾胃虛冷酒食所傷胸膈不快嘔逆惡心呑酸吐水口瘀舌澀不思飲食並宜服之

甘草炙十八兩 乾薑炮二斤半 粟米炒三十兩 桔梗炒三斤

右炒鹽十二兩重同爲細末每服一錢沸湯點食前

諸香

分積香

沉香剉二十五兩 箋香 甲香炭火煮兩日以蜜酒煮熟

檀香剉茶清浸炒黃 沙木炭各二十兩 丁香 藿香葉

麝香研 苓苓香葉 牙硝研各十兩 腦子研三兩

梅花腦研二兩

右除研藥外爲細末用蜜十兩煉同研藥常法燒

衙香

甲香製法同前　沈香剉　箋香剉各六兩　腦子研

麝香研各九兩　牙硝研十二兩　檀香剉十二斤蠟清茶炒

蜜比香秤兩加倍用煉和香

右爲末入研藥用蜜皮和合匀如常法燒

降眞香

紫檀香剉三十兩建茶末一兩湯調濕拌勻慢火炒勿焦末氣盡爲度

白茅香細剉三十兩青州棗二十個擘破水二大升煮變色炒色變揀去棗及不黑用十五兩

紫潤降眞香剉四十兩　焰消湯化飛去滓熬成霜半斤

黃熟香剉三十兩 粉草剉五兩 瓶香二十兩 麝香末十五兩

甘松揀淨 丁皮 藿香各十兩 龍腦二

夌香剉三十兩

右爲末入研藥煉蜜溲和如常法燒

清遠香

降眞香紫藤者 零苓香 茅香各六兩 丁香皮

元參揀淨各五兩 香白芷 藿香剉各三兩 香附子揀淨

甘松揀淨各十兩 麝香末半斤

右爲末煉蜜溲和用如常

增廣太平惠民和劑局方卷十　終

敘

昔神農嘗百草之味以救萬民之疾周官設疾醫之政以掌萬民之病著在簡編為萬世法我宋勃興神聖相授咸以至仁厚德涵養生類且謂札瘥薦臻四時代有救恤之術莫先方書故自開寶以來蚤敕近臣讎校本草厥後纂次神醫普救刊行太平聖惠重定鍼艾俞穴校正千金外臺又作慶歷善救簡要濟衆等方以惠天下或範金揭石或鏤板聯編是雖神農之用心成周之致治無以過也天錫神考睿聖承統其好生之德不特

見於方論而已又設太醫局熟藥所於京師其恤民瘼可謂勤矣主上天縱深仁孝述前列爰自崇寧增置柒局揭以和劑惠民之名俾夫修製給賣各有攸司又設收買藥材所以革僞濫之弊比謂會府咸置藥局所以推廣祖考之德澤可謂曲盡然自創局以來所有之方或取於鬻藥之家或得於陳獻之士未經參訂不無舛訛雖嘗鏤板頒行未免傳疑承誤故有藥味脫滿銖兩過差製作多不依經祖襲間有僞妄至於貼牓謬戾尤多殆不可以一二舉也頃因條具上達朝廷繼而被命

遴選通醫俾之刊正於是請書監之祕文探名賢之别録公私衆本搜獵靡遺事關所從無不研核或端本以正末或泝流以尋源訂其譌謬析其淆亂遺佚者補之重複者削之未閱歲而書成繕寫甫畢謹獻於朝將見合和者得十全之效飲餌者無纖芥之疑頒此成書惠及區宇遂使熙豐惠民之美意祟觀述事之洪規本末巨細無不畢陳納斯民於壽康召和氣於穹壤億萬斯年傳之無極豈不韙歟

將仕郎措置藥局檢閱方書陳承

奉議郎守太醫令兼措置藥局檢閱方書　裴宗元
朝奉郎守尚書庫部郎中提轄措置藥局　陳師文
謹上